

كامزايوس® ▼ (مافاكامتن)

دليل المريض

تاريخ موافقة الهيئة الصحية: 4/6/2024

رقم الموافقة المحلية: 3500-AE-2300009

 Bristol Myers Squibb™

▼ يخضع كامزايوس لمراقبة إضافية. فهذا يتيح التعرف السريع على معلومات جديدة حول مدى أمان هذا الدواء. ويمكنك المساعدة عن طريق الإبلاغ عن أي آثار جانبية قد تظهر عليك.

المقدمة

قُدِّم لك دليل المريض هذا لأن الطبيب وصف لك دواء كامزا يوس، وهو دواء قلب يُصرف فقط بوصفة طبية يستخدم لعلاج البالغين المصابين باعتلال عضلة القلب الضخامي الانسدادي (يُعرف أيضاً بـ HCM).

يتضمن دليل المريض هذا بطاقة المريض.
يرجى حمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات.
أخبر أي أخصائي رعاية صحية يتابع حالتك بأنك تتناول كامزا يوس.
تحتوي بطاقة المريض معلومات عن المخاطر الرئيسية لدواء كامزا يوس وتفاصيل الاتصال بمقدم الوصفة.

كامزا يوس (م-أف-ك-ام-تر)
بطاقة المريض

يُرجى الحرص على قراءة نشرة العبوة لهذا الدواء، مما يمنحك المزيد من المعلومات عن كامزا يوس.
إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى، تحدث مع مقدم الوصفة، أو الطبيب أو الصيدلي.

ما هو اعتلال عضلة القلب الضخامي الانسدادي (HCM)؟

يتسبب اعتلال عضلة القلب الضخامي (HCM) في زيادة سماكة جدار عضلة القلب وتيبسها، مما يجعل امتلاء القلب بالدم أكثر صعوبة. في بعض مرضى اعتلال عضلة القلب الضخامي (HCM)، تصبح عضلة القلب سميكة لدرجة تعيق أو تقلل تدفق الدم من القلب إلى باقي الجسم.

كيف يعمل كامزايوس؟

يعمل كامزايوس عن طريق تقليل الانقباض المفرط للقلب وإعاقة تدفق الدم إلى الجسم. نتيجة لذلك، قد يحسن الأعراض التي تظهر عليك وقدرتك على ممارسة التمارين الرياضية.

ما هي مخططات صدى القلب، وما أهميتها؟

إن إجراء مخططات صدى القلب (تُعرف أيضاً بالإيكو) بانتظام يساعد طبيبك على تقييم مدى تأثير كامزايوس على قلبك. الإيكو عبارة عن اختبار يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صور للقلب. تتيح هذه الاختبارات للطبيب معرفة كيفية استجابة قلبك للعلاج والتأكد من أنك تتناول الجرعة الأمثل. بحسب نتائج الإيكو، قد يزيد الطبيب جرعتك من كامزايوس أو يقللها أو يبقئها كما هي أو يوقف العلاج بشكل مؤقت أو نهائي.

يُجرى الاختبار الأول للإيكو قبل البدء بتناول كامزايوس. تُجرى اختبارات المتابعة للإيكو بعد ٤ و ٨ و ١٢ أسبوعاً من جرعتك الأولى من كامزايوس، ثم كل ١٢ أسبوعاً بعد ذلك.

ستحتاج أيضاً لإجراء اختبارات الإيكو بحسب تعليمات الطبيب في حالة تغيير جرعتك من كامزايوس أو تغيير جرعتك من دواء آخر تتناوله.

من المهم ترتيب مواعيد اختبارات الإيكو والالتزام
بإجرائها بحسب تعليمات مقدم الوصفة.
اضبط التذكيرات على هاتفك أو التقويم لمساعدتك
على تذكر تاريخ ووقت إجراء اختبارات الإيكو.



معلومات السلامة الهامة

- ثمة ثلاثة مخاطر رئيسية مرتبطة بالعلاج بكامزايوس:
- الفشل القلبي الناجم عن قصور الوظيفة الانقباضية، وهي حالة يعجز فيها القلب عن ضخ ما يكفي من الدم إلى الجسم.
 - الفشل القلبي الناجم عن التفاعلات مع بعض الأدوية والمكملات العشبية.
 - سمية الجنين (حدوث تسمم للجنين)

الآثار الجانبية المحتملة الأخرى المرتبطة بكامزايوس موضحة في نشرة معلومات المريض.

كامزايوس والفشل القلبي

الفشل القلبي الناجم عن قصور الوظيفة الانقباضية حالة خطيرة وفي بعض الأحيان تكون مميتة.

أخبر مقدم الوصفة، أو الطبيب، أو اطلب عناية طبية أخرى **فورا** عند ظهور أعراض جديدة أو تفاقم أعراض الفشل القلبي، بما في ذلك ضيق التنفس، أو ألم الصدر، أو الإعياء، أو تسارع ضربات القلب (خفقان)، أو تورم الساق.

أخبر مقدم الوصفة أو الطبيب بأي حالات طبية جديدة أو حالة ظهرت عليك قبل وأثناء العلاج بكامزايوس. قد تؤثر بعض الحالات على العلاج بكامزايوس، مثل العدوى أو الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب وتسارعها).

معلومات السلامة الهامة

كامزايوس والتداخلات الدوائية

قد تؤثر بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية متاحة تُصرف دون وصفة طبية، وبعض المكملات العشبية على مستويات كامزايوس في الجسم وقد تزيد خطر التعرض للفشل القلبي الناجم عن القصور الوظيفي الانقباضي. أخبر مقدم الوصفة، أو الطبيب أو الصيدلي عن جميع الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية والتي تُصرف بدونها والمكملات العشبية التي تتناولها، حتى وإن لم تكن تتناولها يومياً. **لا تبدأ** بتناول أي من أدويةك أو المكملات العشبية، أو تتوقف عن تناولها أو تغيير جرعتها دون التحدث إلى مقدم الوصفة، أو الطبيب أو الصيدلي.

بعض الأمثلة على الأدوية والمنتجات التي قد تؤثر على مستوى كامزايوس في الجسم موضحة في **الجدول 1**. يُرجى ملاحظة أن هذه الأمثلة بمثابة دليل ولا تعتبر قائمة شاملة لجميع الأدوية المحتملة التي قد تندرج تحت هذه الفئة. لا يوصى بالاستخدام المتقطع للمنتجات التي قد تؤثر على مستويات كامزايوس في الجسم، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية و تلك التي تُصرف بدونها، و المكملات العشبية و عصير الجريب فروت.

جدول ١: أمثلة على الأدوية والمنتجات التي قد تؤثر على كامزايوس

الأدوية/المنتجات	الحالة المعالجة
أوميبرازول، إيزوميبرازول	قرح المعدة وارتجاع الحمض
كلاريثرومايسين، ريفامبيسين	العدوى البكتيرية
فيراباميل، ديلتيازيم	الحالات القلبية
فلوكونازول، إيتراكونازول، كيتوكونازول، بوساكونازول، فوريكونازول	العدوى الفطرية
فلوكسيتين، فلوفاكسامين	الاكتئاب
ريتونافير، كوبيسيستات	فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)
تيلابريفير	الالتهاب الكبدي سي
عصير الجريب فروت	

معلومات السلامة الهامة

كامزايوس وسمية الجنين (حدوث تسمم للجنين)

يجب الامتناع عن تناول كامزايوس إذا كنت حاملاً أو لديك القدرة على الإنجاب ولا تستخدمين وسيلة منع حمل فعالة (تنظيم النسل)، فقد يتسبب كامزايوس في إلحاق الضرر بالجنين.

إذا كنت قادرة على الإنجاب، ستحتاجين إلى إجراء اختبار الحمل ويجب أن تكون النتيجة سلبية مؤكدة قبل البدء بتناول كامزايوس. يجب عليك استخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل طوال مدة العلاج بكامزايوس ولمدة 1 أشهر بعد الجرعة الأخيرة منه. ينبغي عليك مناقشة وسيلة/وسائل منع الحمل الأنسب لك مع الطبيب.

استشيري طبيبك إذا ما كنت تفكرين في الإنجاب. إذا كنت حاملاً أو تشكين في أنك قد تكونين حاملاً أثناء العلاج بكامزايوس، أخبري مقدم الوصفة أو الطبيب **على الفور**. سيناقدش معك مقدم الوصفة أو الطبيب الخيارات العلاجية المتاحة أمامك.

متي ينبغي علي طلب العناية الطبية؟

أخبر أي أخصائي رعاية صحية يتابع حالتك في حالة ظهور أي آثار جانبية أثناء تناول كامزايوس، حتى تلك التي لم تكن مدرجة في **دليل المريض** هذا. **الآثار الجانبية المحتملة وتفاصيل كيفية الإبلاغ عنها موضحة أيضاً في نشرة معلومات المريض.** يساعد الإبلاغ عن الآثار الجانبية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع على جمع المزيد من المعلومات حول مدى أمان هذا الدواء.

أخبر مقدم الوصفة، أو الطبيب، أو اطلب عناية طبية أخرى **فورا** عند ظهور أعراض جديدة أو تفاقم أعراض الفشل القلبي، بما في ذلك ضيق التنفس، أو ألم الصدر، أو الإعياء، أو تسارع ضربات القلب (خفقان)، أو تورم الساق.

معلومات إضافية

إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف تتعلق بكامزايوس، يُرجى مناقشتها مع مقدم الوصفة، أو الطبيب أو الصيدلي أو أي عضو من فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتك.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

رقم الهاتف: 8000 444 1712

البريد الإلكتروني: medinfo.uae@bms.com

بطاقة تنبيه المريض هنا



ملاحظات

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

[illegible]

للإبلاغ عن أي آثار جانبية مشتبه بها عبر نظام الإبلاغ الوطني:

وزارة الصحة ووقاية المجتمع،
دولة الإمارات العربية المتحدة:
عبر البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

 Bristol Myers Squibb™
بريستول مايرز سكويب،
دولة الإمارات العربية المتحدة:
عبر البريد الإلكتروني: medinfo.uae@bms.com
أو الاتصال على الرقم: ٨٠٠٠ ٤٤٤ ٧٧١٢

تاريخ موافقة الهيئة الصحية: 4/6/2024
رقم الموافقة المحلية: 3500-AE-2300009
3500-GL-23000017 06/23